

ДОГОВОР

за обществена поръчка с предмет „Доставка на химикали, антитела и конюгати, среди и добавки, ензими и китове, пластмасови и стъклени лабораторни изделия, лабораторни пипети и аксесоари и продукти за молекулярна биология необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти, финансирани от ФНИ, ННП „Храни и здраве“, ННП „БиоАктивМед“ и други“

№ 173/3 12 2020 г.

Днес, 3.12 2020 г. в гр.София на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № РИ-ОП4/994 /09.11.2020 г. на Директора на ИМикБ-БАН за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на химикали, антитела и конюгати, среди и добавки, ензими и китове, пластмасови и стъклени лабораторни изделия, лабораторни пипети и аксесоари и продукти за молекулярна биология необходима за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти, финансирани от ФНИ, ННП „Храни и здраве“, ННП „БиоАктивМед“ и други“ се сключи настоящият договор за следното:

ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ“ ПРИ БАН (ИМикБ-БАН) – с адрес гр. София, ул. “акад. Георги Бончев” бл. 26, ЕИК: 000663700, представляван от проф. д-р Пенка Младенова Петрова, дн - директор, наричан за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна,

и

“Ай Ви Ди България”ООД, БУЛСТАТ/ЕИК 200123131, със седалище и адрес на управление гр.София,ул.“Бигла”№21А, представлявано от Георги Ралчев наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя след заявка лабораторни хмикали и консумативи по Обособени позиции 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 и 175, съгласно Техническо предложение, подробно описани в – Приложение № 1, което е неразделна част от този договор, срещу цена в общ размер до **51 807,23 лева** без включен ДДС. Единичните цени на отделните артикули са съгласно Ценово предложение на Изпълнителя подробно описани в – Приложение № 1

Чл.2. Посочените в Приложение № 1 количества на стоки са „количества до”, т.е. Възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото договорено количество, а има право да заявява количества, съгласно действителните си нужди.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.3. Изпълнителят се задължава:

3.1. да доставя на Възложителя заявените от последния консумативи в уговорения срок, придружени със съответните документи и сертификати за качество;

3.2. да предава на Възложителя консумативи, в заявените от последния вид и количество.

Чл.4 Изпълнителят следва да осигури доставка на консумативи с еквивалентни или по-високи параметри от оферираните, на същата цена в случай, че след подписване на договор не може да достави консумативите предмет на договора поради спиране от производство или каквато и да е друга причина.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5. Възложителят се задължава:

5.1. да приеме доставените от Изпълнителя в уговорените срокове и на уговореното място консумативи, когато те съответстват по вид и количество на направената заявка като провери съответствието им с предварителните условия. При наличие на несъответствие между доставените консумативи с посочените производител, марка, каталожен номер, технически показатели и характеристики и други данни, съдържащи се в офертата, на базата на които е избран Изпълнителят, по своя преценка Възложителят може да откаже приемането им;

5.2. да заплати на Изпълнителя заявените и доставени консумативи в уговорените срокове, когато същите отговарят на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Чл.6. Възложителя има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители

IV. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВЯНЕ

Чл.7. Изпълнителят се задължава да доставя на Възложителя заявените от него консумативи в срок до 15 работни дни от датата на заявката.

Чл.8. Изпълнителят се задължава да уведомява Възложителя за всяка предстояща доставка не по-късно от 12 (дванадесет) часа преди експедицията.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ И РИСК

Чл.9. Мястото за доставяне на консумативите – предмет на този договор е гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев” бл 26, Товаро-разтоварната дейност до склада на Възложителя се извършва от Изпълнителя за негова сметка.

Чл.10. Рискът от случайното погиване или повреждане на консумативите – предмет на този договор преминава върху Възложителя от момента на приемането им на мястото на доставяне, което се удостоверява с подписването на приемно-предавателен протокол от страните.

VI. ГАРАНЦИИ, КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ

Чл.11. Качеството на консумативите – предмет на този договор трябва да отговаря на техническите стандарти на производителите и нормативно установените стандарти за Република България и ЕС.

Чл.12. Към датата на всяка конкретна доставка гаранционните срокове на консумативите трябва да бъдат не по-малки от 70% (седемдесет процента) от обявените от производителите. В случай на доставка на консумативи с по – кратък от договорения срок на годност **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка, както следва:

- **69.99-65 % срок на годност – неустойка 10 % върху стойността на доставката;**
- **64.99-50% срок на годност – неустойка 15 % върху стойността на доставката;**
- **при остатъчен срок на годност по-малък от 50 % се извършва само с писмено съгласие на възложителя, като се дължи неустойка в размер на 20 % върху стойността на доставката.**

Чл.13. Доставката на стоки с остатъчен срок на годност по-малък от 70 на сто от обявения от производителя се извършва само с писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за конкретно количество, определено от него. Без изрично писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** стоките няма да бъдат заплатени.

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на тяхното приемане остатъчният срок на годност е по – малък от 70% (седемдесет процента) от обявените от производителите.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер 3% от стойността на договора без ДДС.Гаранцията се внася по банкова сметка на Възложителя или се учредява като безусловна и неотменима банкова гаранция или сключена застраховка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малко от 30 календарни дни след изтичане срока на договора. Банковата сметка за внасяне на гаранция за изпълнение е:

ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ

Банка – УниКредит Булбанк

клон Хан Аспарух

IBAN – BG47UNCR76303100117357

BIC-UNCRBGSF

(2) Възложителят има право да удържи от гаранцията всички дължими от Изпълнителя неустойки, както и всички суми, които Изпълнителят дължи при отстраняване на дефекти за сметка на последния. Възложителят има право да получи всички дължими неустойки и компенсации в пълен размер, включително в случаите, в които надвишават размера на гаранцията по ал.1.

(3) При липса на възражения по изпълнението на договора Възложителят освобождава гаранцията по ал. 1, внесена като парична сума или връща банковата гаранция/застраховка в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичането на срока на договора, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(4) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VIII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ

Чл.16. Възложителят има право да предявява пред Изпълнителя рекламации за:

а/ количество и/или некомплектованост на доставени консумативи и/или на придружаващата ги техническа документация (явни недостатъци);

б/ качество (скрити недостатъци):

- при доставяне на консумативи не от уговорения вид;
- при установяване на дефекти.

Чл.17. Рекламациите за явни недостатъци могат да бъдат предявявани в 14-дневен срок от доставянето и приемането с приемо-предавателен протокол.

Чл.18. Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя за наличието на дефекти в 14-дневен срок от установяването им.

Чл.19. Във всяка рекламация се посочват: номерът на договора, точното количество на получените консумативи, основанието за рекламацията и конкретното искане на Възложителя.

Чл.20. В 5 /пет/ дневен срок от получаването на рекламацията Изпълнителят е длъжен да отговори на Възложителя в писмена форма конкретно приема ли рекламацията или я отхвърля.

Чл.21. В случай на рекламация за явни недостатъци Изпълнителят е длъжен в 10-дневен срок от получаването на рекламацията, за своя сметка и на свой риск, да достави на място договорените консумативи.

Чл.22. В случай на рекламация за скрити недостатъци Изпълнителят е длъжен в 14-дневен срок от получаването на рекламацията, за своя сметка и на свой риск, да замени консумативите, които са без необходимото качество, или да върне на Възложителя съответната част от заплатената цена, заедно с лихвите от деня на плащането.

Чл.23. Правото на избор между посочените по-горе варианти – да се върне съответната част от заплатената цена или да се доставят нови консумативи принадлежи на Възложителя, като разходите по новото доставяне са за сметка на Изпълнителя.

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.24. (1) При забава на Изпълнителя да изпълни задължението си за доставка, както и в случай, че при предаването на консумативите на Възложителя се открият недостатъци или несъответствие с договора, той дължи неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети от процента) от стойността на договора вноски за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) от стойността на целия договор.

(2) Ако при наличие на рекламации Изпълнителят не изпълни задълженията си по този договор в срок, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на цялата стойност на рекламирания продукт.

(3) В случаите, че Изпълнителят не изпълни задължението си по чл.4, същият дължи неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора.

(4) В случаите по ал.1 - 3 Възложителят може да удържи неустойката от гаранцията за добро изпълнение или да прихване неустойката от дължимо плащане към Изпълнителя без допълнително да кани или уведомява Изпълнителя.

Чл.25. При забава на Възложителя при заплащането на консумативите, той дължи неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети от процента) от стойността на неплатената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5% (пет процента) от стойността на просроченото плащане.

Чл.26. Възложителят запазва правото си да търси обезщетение по общия ред за вредите, надхвърлящи размера на неустойките по този раздел. Неустойките могат да бъдат удържани от дължимо към Изпълнителя плащане.

X. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.27. Плащанията по този договор се извършват в български лева чрез банкови преводи от страна на Възложителя по следната банкова сметка на Изпълнителя:

BG15RZBB91551069459819

BIC- RZBBBGSF

Райфайзенбанк България ЕАД

Чл.28. Консумативите се заплащат по цените, посочени в приложението към този договор, които не подлежат на промяна за срока на действие на този договор.

Чл.29. Възложителят заплаща цената на заявените и доставени консумативи до 60 дни, след доставка, приемане и одобряване на консумативите, и след като Изпълнителят му представи следните документи:

- фактура;
- приемно-предавателен протокол;
- заявка от Възложителя;

Чл.30. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл.9 и чл.10.

XI. СПОРОВЕ

Чл.31. Възникналите във връзка с изпълнението на този договор спорове между страните ще бъдат решавани чрез преговори между тях.

Чл.32. В случай, че по конкретен спор не бъде постигнато споразумение между страните, то същият ще бъде разрешен съгласно действащото в Република България законодателство.

XII. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.33. Този договор влиза в сила от датата на неговото подписване и поражда действие в продължение на **36 месеца**.

ХІІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ (когато е приложимо)

Чл.34(1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор и на Изпълнителя.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл.35. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. Приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

3. При осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите..

Чл.36 (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по ал.1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по ал.2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал.2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

ХІV ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.37. Действието на този договор се прекратява с изтичането на неговия срок или с изчерпване на количествата.

Чл.38. (1) Договорът може да бъде прекратен от Възложителя едностранно и без предизвестие в случай на забава от страна на Изпълнителя на която и да е доставка по този договор, продължила повече от 14 (четиринадесет) дни.

(2) Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

Чл.39. (1) Възложителят може да прекрати едностранно и безвиновно договора с петнадесетдневно предизвестие, отправено до Изпълнителя, в случай че намери това за целесъобразно или са налице трудности при осигуряване на финансиране. В този случай на прекратяване на договора Възложителят не дължи на Изпълнителя обезщетение и/или неустойка за неизпълнените доставки и работа до пълната стойност на договора.

(2) Възложителят може да прекрати едностранно и безвиновно договора с петнадесетдневно предизвестие отправено до Изпълнителя, в случай че същият използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в

офертата му. В този случай на прекратяване на договора Възложителят не дължи на Изпълнителя обезщетение и/или неустойка за неизпълнените доставки

XV. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.40. (1) Страните определят следните адреси и лица за контакти:

За Възложителя

гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев” бл 26., тел. 02 9793157, факс 02 8700109, e-mail: kirkegork@abv.bg, лице за контакти: Иван Иванов

За Изпълнителя

гр.София, жк. Дървеница, бл.48В, тел. 02 4911225, факс 02 9758023, e-mail: ivd@ivd.bg, лице за контакти Георги Ралчев.

(2) Ако някоя от страните промени посочените по-горе адреси и координати, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки или други такива.

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 41. Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП

Чл.42. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

Чл.43. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с него или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, изпълнението или неизпълнението или прекратяването му, ще се уреждат от страните по споразумение.

Чл.44. При непостигане на споразумение страните се договарят да отнесат спора за разглеждане и решаване от компетентния съд.

Чл.45. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или договора като цяло.

Чл. 46. Обработването на лични данни на физически лица в процеса на изпълнение на настоящия договор, ще се извършва при условията на чл. 28 от Общия регламент за защита на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679 и приложимото национално законодателство. Страните приемат и дават съгласието си за съхранение и обработване на личните им данни за целите на настоящата процедура.

Приложение №1: Техническо и ценово предложение;

Договорът е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

За Възложителя: **На осн. чл.36а,
ал. 3 от ЗОП**

проф. д-р. Пенка Петрова, дн
директор на ИМикБ-БАН

За Изпълнителя: **На осн. чл.36а, ал. 3 от ЗОП**

Георги Ралчев

Приложение към договор № 173/3.12 2020 г. с „АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ“ ООД

Обособен а пози ция	Подпози ция	Наименование и техническа характеристика	Мерна единица	Единич а цена без ДДС	Количес тво до	Сума в лева без ДДС
96						
		Моноклонално анти-мише антитяло срещу CD1d (CD1.1, Ly-38) маркирано с APC или еквивалентен флуорохром, клон: 1B1; Изотипен контрол: PE/Dazzle 594 Rat IgG2b, к Isotype Ctrl; Реактивност: мишка, Тип антитяло:моноклонално; Произход: плъх; Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография Разтворът да е свободен от неконюгиран APC. Концентрация: 0.2 mg / ml; Приложение: за флоуцитометрия. Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm);	микрограм	5,75000	100	575,00
		Всичко по позиция 96				575,00
97						

		Анти-човешко CD3 антитяло маркирано с FITC или еквивалентен флуорохром, клон: HIT3a Изотипен контрол: FITC Mouse IgG2a, к Isotype Ctrl Реактивност: човек Тип антитяло:моноклонално Произход: мишка Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Fluorescein Isothiocyanate (FITC) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран FITC. Приложение: FC- Quality tested; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm);	тест	1,140	100	114,00
		Всичко по позиция 97				114,00
98						
		Анти-човешко CD4 антитяло маркирано с APC или еквивалентен флуорохром, клон: A161A1 Изотипен контрол: APC Rat IgG2b, к Isotype Ctrl Реактивност:човек Тип антитяло: моноклонално Имуноген: човешки CD4 Т клетки.Произход: плъх Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Allophycocyanin (APC) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Allophycocyanin и неконюгирано антитяло. Приложение: FC - Quality tested; Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm);	тест	3,20000	100	320,00
		Всичко по позиция 98				320,00

99						
		Анти-мише CD4 антитяло маркирано с APC или еквивалентен флуорохром, клон: GK1.5 ; Изотипен контрол: APC Rat IgG2b, к Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; Имуноген: Mouse CTL clone V4; Получаване: Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Allophycocyanin (APC) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран APC и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Приложение: FC; Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm)	микрогр ам	2,740	100	274,00
		Всичко по позиция 99				274,00
100						
		Анти-човешко CD8a антитяло маркирано с Pacific Blue или еквивалентен флуорохром, клон: HIT8a Изотипен контрол: Pacific Blue Mouse IgG1, к Isotype Ctrl Реактивност: човек, Кръстосана реактивност: шимпанзе, мармозетка Тип антитяло: моноклонално Произход: мишка Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Pacific Blue и неконюгирано антитяло. Приложение: за флоуцитометрия. Дължина на възбуждане: Виолетов лазер (405 nm)	тест	5,600	100	560,00
		Всичко по позиция 100				560,00
101						

		Анти-човешко CD8a антитяло маркирано с PE-Cy7 или еквивалентен флуорохром, клон: HIT8a Изотипен контрол: PE/Cy7 Mouse IgG1, к Isotype Ctrl Реактивност: човек; Кръстосана реактивност: шимпанзе, мармозетка Тип антитяло: моноклонално Произход: мишка Приложение: FC, Дължина на възбуждане: син лазер (488 nm); зелен лазер (532 nm)/жълто-зелен лазер (561 nm)	тест	6,050	100	605,00
		Всичко по позиция 101				605,00
102						
		Анти-човешко CD11b моноклонално антитяло маркирано с PE, клон ICRF44, Mouse IgG1, к; APC label excitation at 633 nm, concentration 0.2 mg/ml, ; Приложение: за флоуцитометрия	тест	2,280	100	228,00
		Всичко по позиция 102				228,00
103						
		Анти-мишо/човешко CD11b антитяло маркирано с APC или еквивалентен флуорохром, клон: M1/70; Изотипен контрол: APC Rat IgG2b, к Isotype Ctrl; Реактивност: мишка, човек; Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; Имуноген: C57BL/10 спленоцити; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с APC или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран APC и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg / ml; Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm); Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	2,170	100	217,00
		Всичко по позиция 103				217,00
104						

		Анти-мише CD11c антитяло маркирано с FITC , клон: N418; Изотипен контрол: FITC Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: арменски хамстер; Имуноген: NKР46-IgG1 Fc фюжън протеин; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Fluorescein (FITC) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран FITC и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg/ml; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm); Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	0,480	500	240,00
		Всичко по позиция 104				240,00
105						
		Анти-човешко CD15 (SSEA-1) антитяло маркирано с FITC или еквивалентен флуорохром, клон HI98 Изотипен контрол: FITC Mouse IgM, к Isotype Ctrl Реактивност: човек, Кръстосана реактивност: шимпанзе Тип антитяло: моноклонално Произход: мишка Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с FITC или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия до >85% чистота. Разтворът да е свободен от неконюгиран FITC. Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm); Приложение: за флоуцитометрия	тест	3,650	100	365,00
		Всичко по позиция 105				365,00
106						

	Анти-човешко CD19 антитяло маркирано с Pacific Blue или еквивалентен флуорохром, клон: H1B19 Изотипен контрол: Pacific Blue Mouse IgG1, к Isotype Ctrl Реактивност: Човек, Шимпанзе, Тип антитяло: моноклонално Произход: плъх Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът е свободен от неконюгиран Pacific Blue и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg/ml; Дължина на възбуждане: Виолетов лазер (405 nm); Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	5,140	100	514,00
	Всичко по позиция 106				514,00
107					
	Анти-мише CD23 антитяло маркирано с Alexa Fluor 700 или или еквивалентен флуорохром, клон: B3B4. Реактивност: мишка. Тип антитяло: моноклонално. Произход: Плъх. Имуноген: Комплекс от IgE с Fcε рецептор, изолиран от миша В хибридомна клетъчна линия O1.2B2. Формулировка: Фосфатно буфериран разтвор, рН 7.2, съдържащ 0.09% натриев азид. Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Alexa Fluor 700 или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Alexa Fluor 700 и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg/ml. Приложение: FC. Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm).	микрогр ам	4,570	100	457,00
	Всичко по позиция 107				457,00
108					

		Анти-човешко CD24 антитяло маркирано с Allophycocyanin (APC) или еквивалентен флуорохром, клон: ML5 Изотипен контрол: APC Mouse IgG2a, κ Isotype Ctrl Реактивност: човек, Кръстосана реактивност: шимпанзе Тип антитяло:моноклонално Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Allophycocyanin (APC) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран APC. Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm); Приложение: за флоуцитометрия	тест	6,740	100	674,00
		Всичко по позиция 108				674,00
109						
		Анти-мише CD25 антитяло маркирано с FITC или еквивалентен флуорохром, клон: PC61; Изотипен контрол: FITC Rat IgG1, λ Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; Имуноген: IL-2-dependent cytolytic mouse T-cell clone B6.1; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Fluorescein (FITC) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран FITC и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg/ml; Приложение: FC; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm);	микрогр ам	0,980	500	490,00
		Всичко по позиция 109				490,00
110						

		Анти-човешко CD27 антитяло, маркирано с Fluorescein Isothiocyanate (FITC) или еквивалентен флуорохром, клон: O323 Изотипен контрол: FITC Mouse IgG1, к Isotype Ctrl Реактивност: Human, African Green, Baboon, Cynomolgus, Rhesus, Squirrel Monkey Тип антитяло:моноклонално Произход: мишка Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Fluorescein Isothiocyanate (FITC) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран FITC. Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm); Приложение: за флоуцитометрия	тест	1,940	100	194,00
		Всичко по позиция 110				194,00
111						
		Анти-човешко CD38 антитяло маркирано с Fluorescein Isothiocyanate (FITC) или еквивалентен флуорохром, клон: HIT2 Изотипен контрол: FITC Mouse IgG1, к Isotype Ctrl Реактивност: човек, шимпанзе, Кон Тип антитяло:моноклонално Произход: мишка Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Fluorescein Isothiocyanate (FITC) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран FITC. Приложение: FC- Quality tested; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm);	тест	1,820	100	182,00
		Всичко по позиция 111				182,00

112						
		Анти-човешко CD45 антитяло конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром, клон: 2D1 Изотипен контрол: PE Mouse IgG1, к Isotype Ctrl (FC) Реактивност: човек; Тип антитяло: моноклонално Произход: мишка Имуноген: човешки PBMC Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Phycoerythrin и неконюгирано антитяло. Дължина на възбуждане: син лазер (488 nm); зелен лазер (532 nm)/жълто-зелен лазер (561 nm). Приложение: за флоуцитометрия	тест	2,850	100	285,00
		Всичко по позиция 112				285,00
113						
		Анти-човешко CD45 антитяло конюгирано с Fluorescein Isothiocyanate (FITC) или еквивалентен флуорохром, клон: 2D1 Изотипен контрол: FITC Mouse IgG1, к Isotype Ctrl Реактивност: човек; Тип антитяло: моноклонално Произход: мишка Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Fluorescein Isothiocyanate (FITC) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Fluorescein Isothiocyanate и неконюгирано антитяло. Приложение: FC, Дължина на възбуждане: син лазер (488 nm);	тест	2,850	100	285,00
		Всичко по позиция 113				285,00

114						
		Анти-мише CD45 антитяло конюгирано с Alexa Fluor 700 или еквивалентен флуорохром, клон: 30-F11. Изотипен контрол: Alexa Fluor 700 Rat IgG2b, к Isotype Ctrl. Реактивност: Мишка. Тип антитяло: моноклонално. Произход: Плъх. Имуноген: Миши тимус или слезка. Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Alexa Fluor 700 или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Alexa Fluor 700 и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg / ml. Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm) Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	4,450	100	445,00
		Всичко по позиция 114				445,00
115						
		Анти-мише CD68 антитяло конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром, клон: FA-11 Изотипен контрол: PE Rat IgG2a, к Isotype Ctrl Реактивност: мишка Тип антитяло: моноклонално Произход: плъх Имуноген: Purified Con A receptor glycoproteins from the P815 cell line Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Phycoerythrin и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm); Зелен лазер (532 nm)/Жълто-зелен лазер (561 nm). Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	6,280	100	628,00
		Всичко по позиция 115				628,00
116						

		Анти-мише CD80 антитяло конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен флуорохром, клон: 16-10A1 Изотипен контрол: Pacific Blue Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl Реактивност: мишка Тип антитяло: моноклонално Произход: арменски хамстер Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Pacific Blue и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg/ml; Дължина на възбуждане: Виолетов лазер (405 nm); Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	6,280	100	628,00
		Всичко по позиция 116				628,00
117						
		Анти-мише CD86 антитяло конюгирано с Allophycocyanin (APC) или еквивалентен флуорохром, клон: GL-1 Изотипен контрол: APC Rat IgG2a, к Isotype Ctrl Реактивност: мишка Тип антитяло: моноклонално Имуноген: LPS-activated CBA/Ca mouse splenic B cells Произход: плъх Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Allophycocyanin (APC) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Allophycocyanin и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm); Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	5,480	100	548,00
		Всичко по позиция 117				548,00
118						

		Анти-мише CD117 (c-Kit) антитяло конюгирано с Allophycocyanin (APC) или еквивалентен флуорохром , клон: 2B8. Изотипен контрол: APC Rat IgG2b, к Isotype Ctrl. Реактивност: мишка, Тип антитяло:моноклонално. Произход: плъх. Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Allophycocyanin (APC) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран APC. Концентрация: 0.2 mg / ml. Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm). Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	4,000	100	400,00
		Всичко по позиция 118				400,00
119						
		Анти-човешко Siglec-8 антитяло конюгирано с Allophycocyanin (APC) или еквивалентен флуорохром, клон: 7C9 Изотипен контрол: APC Mouse IgG1, к Isotype Ctrl Реактивност: човек, Тип антитяло:моноклонално Произход: мишка Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Allophycocyanin (APC) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран APC. Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm). Приложение: за флоуцитометрия	тест	6,850	100	685,00
		Всичко по позиция 119				685,00
120						

	Анти-мише CD163 антитяло конюгирано с Brilliant Violet 421 или еквивалентен флуорохром, клон: S15049I Изотипен контрол: Brilliant Violet 421 Rat IgG2a, к Isotype Ctrl Реактивност:мишка Тип антитяло: моноклонално Имуноген: Recombinant mouse CD163 extracellular domain Произход: плъх Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Brilliant Violet 421 или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Brilliant Violet 421 и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Приложение: FC - Quality tested; Дължина на възбуждане: 405 nm и излъчва при 421 nm.	микрогр ам	11,880	50	594,00
	Всичко по позиция 120				594,00
121					
	Анти-мише CD206 (MMR) антитяло конюгирано с Allophycocyanin (APC) или еквивалентен флуорохром, клон: C068C2 Изотипен контрол: APC Rat IgG2a, к Isotype Ctrl Реактивност:мишка Тип антитяло: моноклонално Имуноген: Recombinant mouse CD206 (MMR) Произход: плъх Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Allophycocyanin (APC) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Allophycocyanin и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm). Приложение: за флуоцитометрия	микрогр ам	5,710	100	571,00
	Всичко по позиция 121				571,00

122						
		Анти-човешко FcεRIα антитяло конюгирано с FITC или еквивалентен флуорохром, клон AER-37 Изотипен контрол: FITC Mouse IgG2b, κ Isotype Ctrl Реактивност: човек, Тип антитяло: моноклонално Произход: мишка Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с FITC или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия до >85% чистота. Разтворът да е свободен от неконюгиран FITC. Приложение: FC- Quality tested; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm);	тест	5,480	100	548,00
		Всичко по позиция 122				548,00
123						
		Анти-мише FcεRIα антитяло конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен флуорохром, клон: MAR-1. Изотипен контрол: Pacific Blue Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl. Реактивност: мишка, Тип антитяло: моноклонално. Произход: арменски хамстер. Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Pacific Blue и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg / ml. Дължина на възбуждане: Виолетов лазер (405 nm). Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	6,050	100	605,00
		Всичко по позиция 123				605,00
125						

		Заешко анти-човешко/мише Gonadotropin-releasing hormone receptor (GNRHR) поликлонално антитяло Реактивност: мишка, човек Тип антитяло: поликлонално Произход: заек Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография Приложение: ELISA (EIA), Western Blot (WB), имунохистохимия (IHC), флоуцитометрия (FC/FACS), имунопреципитация (IP)	микрогр ам	8,000	100	800,00
		Всичко по позиция 125				800,00
126						
		Моноклонално заешко Estrogen Related Receptor alpha антитяло Реактивност: мишка, плъх, човек Тип антитяло: моноклонално Произход: заек Имуноген: Recombinant Protein Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография Съхранение: - 20 °C. Приложение: Western Blot (WB), Immunoprecipitation (IP), Flow Cytometry (FC/FACS)	микроли тър	9,500	100	950,00
		Всичко по позиция 126				950,00
127						
		Анти-мише Ly6C, конюгирано с APC или еквивалентен флуорохром, клон HK1.4, rat Rat IgG2a, κ; Immunogen L3 cloned CTL cells; APC label excitation at 633 nm, concentration 0.2 mg/ml. Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	9,600	25	240,00
		Всичко по позиция 127				240,00
128						
		goat anti-rat IgG (minimal x-reactivity) антитяло HRP-маркирано, клон Poly4054, Goat polyclonal IgG; suitable for immunoblot, ELISA, IHC; lot specific concentration in 500 microL. Приложение: за флоуцитометрия	микроли тър	0,520	500	260,00

		Всичко по позиция 128				260,00
129						
		Анти-мише Ly6G антицяло конюгирано с PerCP или еквивалентен флуорохром, клон 1A8 Rat IgG2a, κ; Immunogen Ly-6G transfected EL-4J cell line; tested for flow cytometry; label with maximum absorption of 482 nm and a maximum emission of 675 nm; concentration 0.2 mg/ml. Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	7,790	25	194,75
		Всичко по позиция 129				194,75
130						
		Пречистено анти-SIRT1 антицяло Rat IgG2a, κ; immunogen partial human SIRT1 recombinant protein (548-747 a.a.) expressed in E. coli., for immunoblot application; concentration 0.5 mg/ml. Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	4,660	100	466,00
		Всичко по позиция 130				466,00
131						
		Анти-мише Ly-6C антицяло конюгирано Alexa Fluor 700 или еквивалентен флуорохром, клон: HK1.4. Изотипен контрол: Alexa Fluor 700 Rat IgG2c, κ Isotype Ctrl. Реактивност: мишка. Тип антицяло: моноклонално. Произход: Плъх . Имуноген: L3 клонирани CTL клетки. Получаване: Антицялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано Alexa Fluor 700 или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Alexa Fluor 700. Концентрация: 0.5 mg / ml. Приложение: флоуцитометрия, ICFC. Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm)	микрогр ам	4,880	100	488,00
		Всичко по позиция 131				488,00
132						

		Анти-мише CD25 антитяло конюгирано с APC или еквивалентен флуорохром, клон: PC61; Изотипен контрол: APC Rat IgG1, λ Isotype Ctrl; Реактивност: мишка, Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; Имуноген: IL-2-dependent cytolytic mouse T-cell clone B6.1; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с APC или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран APC и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg / ml; Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm) Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	3,040	100	304,00
		Всичко по позиция 132				304,00
133						
		Анти-мише CD8a антитяло конюгирано с APC или еквивалентен флуорохром, клон: 53-6.7 ; Изотипен контрол: APC Rat IgG2b, κ Isotype Ctrl; Реактивност: мишка, Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; Имуноген: миши тимус или слезка; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с APC или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран APC и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg / ml; Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm) Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	2,060	100	206,00
		Всичко по позиция 133				206,00
134						

		Анти-мише CD335 (NKp46) антитяло конюгирано с Fluorescein (FITC) или еквивалентен флуорохром, клон: 29A1.4; Изотипен контрол: FITC Rat IgG2a, к Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; Имуноген: NKp46-IgG1 Fc фюжън протеин; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Fluorescein (FITC) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран FITC и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg/ml; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm); Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	4,770	100	477,00
		Всичко по позиция 134				477,00
135						
		Анти-мише CD8a антитяло конюгирано с Fluorescein (FITC) или еквивалентен флуорохром , клон: 53-6.7; Изотипен контрол: FITC Rat IgG2a, к Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; Имуноген: миши тимус или слезка; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Fluorescein (FITC) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран FITC и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg/ml; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm); Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	0,390	500	195,00
		Всичко по позиция 135				195,00
136						

		Анти-мише/човешко CD45R/B220 антитяло конюгирано с Fluorescein Isothiocyanate (FITC) или еквивалентен флуорохром, клон: RA3-6B2 Изотипен контрол: FITC Rat IgG2a, к Isotype Ctrl Реактивност: мишка;човек Тип антитяло: моноклонално Произход: плъх Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Fluorescein Isothiocyanate (FITC) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Fluorescein Isothiocyanate и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg/ml; Дължина на възбуждане: син лазер (488 nm); Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	0,410	500	205,00
		Всичко по позиция 136				205,00
137						
		Анти-мише CD19 антитяло конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен флуорохром, клон: H1B19; Изотипен контрол: Pacific Blue Mouse IgG1, к Isotype Ctrl; Реактивност: Човек, Шимпанзе; Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Pacific Blue и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg/ml; Дължина на възбуждане: Виолетов лазер (405 nm). Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	4,230	100	423,00
		Всичко по позиция 137				423,00
138						

		Анти-мише CD3ε антитяло, конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен флуорохром, клон: 145-2C11. Изотипен контрол: Pacific Blue Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl. Реактивност: мишка. Тип антитяло: моноклонално. Произход: Арменски хамстер. Имуноген: Н-2Kb- специфични миши цитотоксични Т лимфоцити клон ВМ10-37. Произход: Арменски хамстер. Имуноген: Н-2Kb- специфични миши цитотоксични Т лимфоцити клон ВМ10-37. Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Pacific Blue и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg / ml. Приложение: FC. Дължина на възбуждане: Виолетов лазер (405 nm).	микрогр ам	4,880	100	488,00
		Всичко по позиция 138				488,00
139						
		Анти-мише Ly-6G антитяло конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен флуорохром, клон: 1A8; Изотипен контрол: Pacific BlueRat IgG2a, κ Isotype Ctrl; Реактивност: мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; Имуноген: Ly-6G трансфектирана EL-4J клетъчна линия; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Pacific Blue и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg / ml; Дължина на възбуждане: Виолетов лазер (405 nm) Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	4,880	100	488,00
		Всичко по позиция 139				488,00
140						

	Анти-човешко CD203c (E-NPP3) антитяло конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром, клон: NP4D6 Изотипен контрол: PE Mouse IgG1, к Isotype Ctrl (FC) Реактивност: човек; Тип антитяло: моноклонално Произход: мишка Имуноген: човешки PBMC Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Phycoerythrin и неконюгирано антитяло. Дължина на възбуждане: син лазер (488 nm); зелен лазер (532 nm)/жълто-зелен лазер (561 nm). Приложение: за флоуцитометрия	тест	5,200	100	520,00
	Всичко по позиция 140				520,00
141					
	Анти-мише CD107a (LAMP-1) антитяло конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром, клон: 1D4B. Изотипен контрол: PE Rat IgG2a, к Isotype Ctrl. Реактивност: мишка. Тип антитяло: моноклонално. Произход: Плъх. Имуноген: срещу NIH / 3T3 миши ембрионални фибробластни тъканни култури - N-края на LAMP-1. Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран PE и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg / ml. Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm); Зелен лазер (532 nm)/Жълтозелен лазер (561 nm). Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	2,870	200	574,00
	Всичко по позиция 141				574,00
142					

		Анти-мише CD138 (Syndecan-1)антитяло конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром , клон: 281-2; Изотипен контрол: PE Rat IgG2a, к Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: Плъх; Имуноген: Епителна клетъчна линия на миши млечна жлеза NmuMG;Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран PE и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm); Зелен лазер (532 nm)/Жълтозелен лазер (561 nm). Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	3,200	200	640,00
		Всичко по позиция 142				640,00
143						
		Анти-мише CD170 (Siglec-F) антитяло конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром, клон 1B1; Изотипен контрол PE/Dazzle 594 Rat IgG2b, к Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: Плъх; Имуноген: Mouse Cd1.1 cDNA-transfected RMA-S mouse T lymphoma; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран PE и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm). Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	6,400	100	640,00
		Всичко по позиция 143				640,00
144						

		Анти-мише CD19 антитяло конюгирано с PE или еквивалентен флуорохром, клон: 6D5; Изотипен контрол: PE Rat IgG2a, к Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; Имуноген: Mouse CD19-expressing K562 human erythroleukemia cells; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с PE или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран PE и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm), Зелен лазер (532 nm), Жълто-зелен (561 nm). Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	1,190	200	238,00
		Всичко по позиция 144				238,00
145						
		Анти-мише CD3 антитяло конюгирано с PE или еквивалентен флуорохром, клон: 145-2C11; Изотипен контрол: PE Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: арменски хамстер; Имуноген: H-2Kb-specific mouse cytotoxic T lymphocyte clone BM10-37; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с PE или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран PE и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm), Зелен лазер (532 nm), Жълто-зелен (561 nm). Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	1,030	200	206,00
		Всичко по позиция 145				206,00
146						

		Анти-мише CD4 антитяло конюгирано с PE или еквивалентен флуорохром , клон: GK1.5; Изотипен контрол: PE Rat IgG2b, к Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: арменски хамстер; Имуноген: Mouse CTL clone V4; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с PE или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран PE и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm), Зелен лазер (532 nm), Жълто-зелен (561 nm). Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	0,650	200	130,00
		Всичко по позиция 146				130,00
147						
		Анти-мише CD5 антитяло конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром, клон: 53-7.3; Изотипен контрол: PE Rat IgG2a, к Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално. Произход: Плъх; Имуноген: Миши тимус или слезка; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран PE и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm); Зелен лазер (532 nm)/Жълтозелен лазер (561 nm). Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	2,710	200	542,00
		Всичко по позиция 147				542,00
148						

		Анти-мише CD69 антитяло конюгирано с PE или еквивалентен флуорохром, клон: H1.2F3; Изотипен контрол: PE Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: арменски хамстер; Имуноген: Mouse CTL clone V4; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с PE или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран PE и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm), Зелен лазер (532 nm), Жълто-зелен (561 nm). Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	2,710	200	542,00
		Всичко по позиция 148				542,00
149						
		Анти-мише CD90.2 (Thy-1.2) антитяло конюгирано с PE или еквивалентен флуорохром, клон: 30-H12; Изотипен контрол: PE Rat IgG2b, κ Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; Имуноген: миши тимус или слезка; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с PE или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран PE и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm), Зелен лазер (532 nm), Жълто-зелен (561 nm). Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	1,570	200	314,00
		Всичко по позиция 149				314,00
150						

		Анти-мише F4/80 антитяло конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром , клон: BM8. Изотипен контрол: PE Rat IgG2a, к Isotype Ctrl. Реактивност:мишка . Тип антитяло: моноклонално . Произход: Плъх . Имуноген:миши макрофаги. Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Phycoerythrin (PE). Концентрация: 0.2 mg / ml. Приложение: флоуцитометрия, ICFC. Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm); Зелен лазер (532 nm)/Жълто-зелен лазер (561 nm).	микрогр ам	2,710	100	271,00
		Всичко по позиция 150				271,00
151						
		Анти-мише FOXP3 антитяло конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром, клон: MF-14. Изотипен контрол: PE Rat IgG2b, к Isotype Ctrl. Реактивност: мишка. Тип антитяло: моноклонално. Произход: Плъх. Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран PE и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml. Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm); Зелен лазер (532 nm)/Жълтозелен лазер (561 nm). Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	7,050	100	705,00
		Всичко по позиция 151				705,00
152						

		Анти-мише/плъх/човешко CD27 антияло конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром, клон: LG.3A10; Изотипен контрол: PE Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка, плъх, човек. Тип антияло: моноклонално. Произход: Арменски хамстер. Имуноген: фибробластна линия от Арменски хамстер ARHO12 трансфектирана с миша CD27 cDNA. Получаване: Антиятлото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран PE и неконюгирано антияло. Концентрация: 0.2 mg/ml. Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm); Зелен лазер (532 nm)/Жълтозелен лазер (561 nm). Приложение: за флоуцитометрия.	микрогр ам	2,980	200	596,00
		Всичко по позиция 152				596,00
153						
		Анти-мише CD69 антияло конюгирано с PE-Су7 или еквивалентен флуорохром, клон: H1.2F3; Изотипен контрол: PE/Су7 Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антияло: моноклонално; Произход: арменски хамстер; Имуноген: Mouse dendritic epidermal T cell line Y245; Получаване: Антиятлото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с PE/Су7 или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран PE/Су7 и неконюгирано антияло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Приложение: за флоуцитометрия. Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm), Зелен лазер (532 nm), Жълто-зелен (561 nm)	микрогр ам	3,800	100	380,00
		Всичко по позиция 153				380,00
154						

		Анти-мише CD8b.2 антицяло конюгирано с РеСy7 или еквивалентен флуорохром, клон: 53-6.7; Изотипен контрол: PE/Cy7 Rat IgG2a, к Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антицяло: моноклонално; Произход: плъх; Имуноген: миши тимус или слезка; Получаване: Антицялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с РеСy7 или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран РеСy7 и неконюгирано антицяло.Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm), Зелен лазер (532 nm), Жълто-зелен (561 nm). Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	6,400	100	640,00
		Всичко по позиция 154				640,00
155						
		Анти-мише CD4 антицяло конюгирано с РеСy5 или еквивалентен флуорохром, клон: GK1.5; Изотипен контрол: РеСy5 Rat IgG2b, к Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антицяло: моноклонално;Произход: плъх; Имуноген: Mouse CTL clone V4; 100мкг/оп Получаване: Антицялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с РеСy5 или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран РеСy5 и неконюгирано антицяло.Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm), Зелен лазер (532 nm), Жълто-зелен (561 nm) . Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	4,340	100	434,00
		Всичко по позиция 155				434,00
156						

	Анти-мише IL-10 антитяло конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром, клон: JES5-16E3 Изотипен контрол: PE Rat IgG2b, к Isotype Ctrl Реактивност: мишка Тип антитяло: моноклонално Произход: плъх Имуноген: E. coli - експресираща рекомбинантен миши IL-10 Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Phycoerythrin и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm); Зелен лазер (532 nm)/Жълто-зелен лазер (561 nm). Приложение: за флуоцитометрия	микрогр ам	4,340	100	434,00
	Всичко по позиция 156				434,00
157					
	Пречистено анти-човешко CD28 антитяло, клон: CD28.2 Изотипен контрол: Purified Mouse IgG1, к Isotype Ctrl Реактивност: Човек, Тип антитяло: моноклонално Произход: мишка Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография; Концентрация: 0.5 mg/ml Приложение: за флуоцитометрия	микрогр ам	0,970	100	97,00
.	Всичко по позиция 157				97,00
158					

		Пречистено анти-човешко CD3 антитяло, клон: HIT3a Изотипен контрол: Purified Mouse IgG2a, к Isotype Ctrl Реактивност: Човек, Тип антитяло: моноклонално Произход: мишка Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография; Концентрация: 0.5 mg/ml Приложение: за флоуцитометрия	микрогр ам	0,970	100	97,00
.		Всичко по позиция 158				97,00
160						
		5-mC DNA ELISA Kit Кит за определяне на 5-mC ДНК Източници на проби–пречистена геномнаДНК, плазмидна ДНК, амплифицирани продукти от ПСР, ДНК фрагменти във вода, Tris-EDTA или подобни. Количество ДНК–да е оптимизиран за 100 ng ДНК/ямка. Да е подходящ за ДНК в границите 10-200 ng. Детекция–≥ 0.5% 5-метилцитозин(5-mC) за 100 ng едноверижна ДНК. Кита да съдържа: * Буфер за натоварване; * ЕЛАЙЗА буфер; * анти-5- метилцитозин; *вторично антитяло; * HRP проявител; * негативна контрола; * позитивна контрола; * 96-ямкова плака	тест	8,990	192	1726,08
.		Всичко по позиция 160				1726,08
161						
	161,1	Annexin V-FITC кит за детекция на апоптоза; Кит за флоуцитометричен анализ на апоптоза; Реактивност: всички бозайници; Лазер за възбуждане: Син лазер (488 nm) Съдържание: -rh Анексин V-FITC; - Анексин V Свързващ буфер; - Пропидиев йодид ; Приложение: за флоуцитометрия	тест	4,400	300	1320,00

	161,1	Кит за детекция на апоптоза -PE Annexin V и 7-AAD; Анексин А5 Кит за детекция на апоптоза. Реактивност: всички бозайници; Приложение:FC Съдържание: PE АнексинV; 7-AAD оцветяващ разтвор за преживяемост; АнексинV свързващ буфер; Приложение: за флоуцитометрия	тест	4,45	100	445,00
		Всичко по позиция 161				1765,00
162						
		ЕЛАЙЗА кит за миши IL-17A Съдържание на кита: • мише IL-17A ЕЛАЙЗА улавящо антитяло • мише IL-17A ЕЛАЙЗА детектиращо антитяло • миши IL-17A стандарт • Авидин-HRP • Субстратен разтвор Tetramethylbenzidine (TMB) • Буфер за натоварване • 96 ямкови плаки Реактивност: мишка Приложение: ЕЛАЙЗА Чувствителност 4 pg/ml Диапазон: 4-500 pg/ml Опаковка до 960 теста	тест	1,130	960	1084,80
.		Всичко по позиция 162				1084,80
163						

	ЕЛАИЗА Кит за човешки Интерлевкин-4 с висока чувствителност. За количествено определяне на човешки IL-4 в човешки серум, плазма, амниотична течност или култорална клетъчна среда. Да разпознава естествен и рекомбинантен човешки IL-4. Аналитично чувствителност: 0.1 pg/ml Диапазон: 0.25-16.0 pg/ml Съдържание: *Натоварена 96 ямкова плака *Стандарт *Буфер за разраждане на пробите *Assay Буфер - Концентрат *Биотилинирано антитяло за детекция *Увеличаващ разтворител-концентрат * Увеличаващ Реагент I * Увеличаващ Реагент II *SAV-HRP *Контроли * Буфер за миене *Хромоген *Разтвор за спиране на реакцията *самозалепващи протектори за плака	тест	11,320	288	3260,16
.	Всичко по позиция 163				3260,16
164					

	ЕЛАИЗА кит за човешки IFN gamma с висока чувствителност За количествено определяне на IFN gamma в човешки серум, плазма, амниотична течност или култорална клетъчна среда. Да разпознава естествен и рекомбинантен човешки IL-4. Аналитично чувствителност: 0.06 pg/ml Диапазон: 0.16-10.0 pg/ml Съдържание: *Натоварена 96 ямкова плака *Стандарт *Буфер за разраждане на пробите *Assay Буфер - Концентрат *Биотинилирано антитяло за детекция *Увеличаващ разтворител-концентрат * Увеличаващ Реагент I * Увеличаващ Реагент II *SAV-HRP *Контроли * Буфер за миене *Хромоген *Разтвор за спиране на реакцията *самозалепващи протектори за плака	тест	11,320	288	3260,16
.	Всичко по позиция 164				3260,16
165					

	Кит за човешки TNF alpha с висока чувствителност. За количествено определяне на човешки TNF alpha gamma в човешки серум, плазма, амниотична течност или култорална клетъчна среда. Да разпознава естествен и рекомбинантен човешки TNF alpha. Аналитично чувствителност: 0.13 pg/ml Диапазон: 0.31-20.0 pg/ml Съдържание: *Натоварена 96 ямкова плака *Стандарт *Буфер за разраждане на пробите *Assay Буфер - Концентрат *Биотилинирано анти тяло за детекция *Увеличаващ разтворител-концентрат * Увеличаващ Реагент I * Увеличаващ Реагент II *SAV-HRP *Контроли * Буфер за миене *Хромоген *Разтвор за спиране на реакцията *самозалепващи протектори за плака	тест	11,920	288	3432,96
.	Всичко по позиция 165				3432,96
166					

	ЕЛАЙЗА Кит за човешки Интерлевкин-10 с висока чувствителност. За количествено определяне на човешки IL-10 в човешки серум, плазма, амниотична течност или култорална клетъчна среда. Да разпознава естествен и рекомбинантен човешки IL-10. Аналитично чувствителност: 0.05 pg/ml Диапазон: 0.39-25.0 pg/ml Съдържание: *Натоварена 96 ямкова плака *Стандарт *Буфер за разраждане на пробите *Assay Буфер - Концентрат *Биотилинирано антитяло за детекция *Увеличаващ разтворител-концентрат * Увеличаващ Реагент I * Увеличаващ Реагент II *SAV-HRP *Контроли * Буфер за миене *Хромоген *Разтвор за спиране на реакцията *Самостоятелни протекторни плаки	тест	11,320	288	3260,16
.	Всичко по позиция 166				3260,16
167					

	ЕЛАЙЗА кит за човешки IL-17A с висока чувствителност За количествено определяне на човешки IL-17A в човешки серум, плазма, амниотична течност или култорална клетъчна среда. Да разпознава естествен и рекомбинантен човешки IL-17A. Аналитично чувствителност: 0.01pg/ml Диапазон: 0.23-15 pg/ml Съдържание: *Натоварена 96 ямкова плака *Стандарт *Буфер за разраждане на пробите *Assay Буфер - Концентрат *Биотилинирано анти тяло за детекция *Увеличаващ разтворител-концентрат * Увеличаващ Реагент I * Увеличаващ Реагент II *SAV-HRP *Контроли * Буфер за миене *Хромоген *Разтвор за спиране на реакцията *самостоятелни протектори за плака	тест	11,320	288	3260,16
.	Всичко по позиция 167				3260,16
175	Мултиплексна система за едновременен флоуцитометричен анализ				

	175,1	Мултиплексна система за анализ на човешки Th17 панел. Панел от мултиплексни флуоресцентно-белязани частици за флоуцитометричен анализ. Да позволява едновременен количествен анализ на осем човешки цитокина - IL-6, IL-10, IL-17A, IL-17F, IL-21, IL-22, IFN-γ и TNF-α. Съдържание на кита: · Комплект частици 1: FITC белязани частици (1 ml) · Комплект частици 2: PE белязани частици (1 ml) · Комплект частици 3: Небелязани частици (2 ml) · Улавящи частици · Детектираци антитела (3.5 ml) · Лиофилизиран стандартен коктейл, (1 vial) · SA-PE (3.5 ml) · Matrix B, лиофилизиран(1 vial) · Буфер (25 ml) · Буфер за миене, 20X (25 ml) · Протектори за плаки (4 бр) · Донгъл за софтуер за анализ на данните · V-образна плака · Упътване	тест	21,710	100	2171,00
--	-------	---	------	--------	-----	---------

	175,2	Мултиплексна система за анализ на човешки Th1/Th2 панел.Панел от мултиплексни флуоресцентно-белязани частици за флоуцитометричен анализ. Да позволява едновременен количествен анализ на осем човешки цитокина - IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, IFN-γ и TNF-α. Съдържание на кита: · Комплект частици 1: FITC белязани частици (1 ml) · Комплект частици 2: PE белязани частици (1 ml) · Комплект частици 3: Небелязани частици (2 ml) · Улавящи частици · Детектираци антитела (3.5 ml) · Лиофилизиран стандартен коктейл, (1 vial) · SA-PE (3.5 ml) · Matrix B, лиофилизиран(1 vial) · Буфер (25 ml) · Буфер за миене, 20X (25 ml) · Протектори за плаки (4 бр) · Донгъл за софтуер за анализ на данните · V-образна плака · Упътване	тест	21,71	100	2171,00
		Всичко по позиция 175				4342,00

Обща сума без ДДС:

51807,23

Възложител

ИМикБ-БАН На осн. чл.36а, ал. 3 от ЗОП

Директор:

Доц. д-р Пенка Петрова, дн

Изпълнител:

Ай Ви Ди България ООД

Управител:

ПОДПИС:..... На осн. чл.36а, ал. 3 от ЗОП